Tamarez de Redondo Vass7R08s376-380

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1092

dontarbasian daring basind

Tamarez de Redondo 7 R8 s 376.380 X









NOM Tawares de ledoudo EMPLACEMENT 7 loraison Véraison

Souche Nore Débourrement Nore Ferti Floraison Véraison
yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité

2 2 18,5 21,3 0

Grappe: G - M - P Dim:
Compacité: L - N - C

Pour: Mill:
Baie: TC - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré
Saveur: s - m - ar - fox - herb
Pépins: avec - apyrène
Port: Myl Vigueur: 25

Juntumbuda

ahaataahaataahaataahaataah

1992 ANNEE												
NOM Tamorez de Redondo EMPLACEMENT 4 R8 1 376-380												
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement. mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor début	raison mi/f	fin		mi/v	fin	Maturité
2 3 4 5	f 4 4		23.3.	0	Pour : Baie :	TG - (disc-s) r : B-6 r : s r : ave	Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	1 ; - P ; -ov-o; Rg-N ; r - f; yrène	Dim: bov-cyl	l-fus inc		: L - M- C

ANNEE 4993

funtandampadama

MGM Tamarez de RedondoEMPLACEMENT 7 R80-376.380

Pgal.	2.84.	NAA.	h ferridiffications										
ouche	Mbre	Déhorum début hi com	Whre grap	Ferti- litě	Floraison début mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturit6			
\$ *	4	22,3; 25,3×	0	2/	29.5 3.6	6.6	£7.7	1.8	28	30.8 +3			
3 } 4 } 5	5	25,3 25,3 A	2	Crappe: G - M - P Dim : Compacité: L - P - C Pour : Mill : Baie : TG - G - M - P Dim :									
	Dle 27.3,93				disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Popins: avec - apyrène Port: Vigueur:								
								,					

duotoohiimimilaataaliintaal

ANNEE: 1994 NOM Tamarez de Redondo EMPLACEMENT 7 R8 1376.380												
Souche	Nbre yeux		rroment mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v	fin	Maturit€
2 3 4 5	4 3			0	Couleu Saveur	G - G - Giscon	MIL MIL G-M Sph-el Gr-Rs- m - a	Dim 1 : 3 - P D 1-ov- Rg-N r - for	:13 im :19 obov-cy	Compa yl-fus : inc	cité:	22.8 +2 L-M-c

ANNEE: 1995 NOM Tamarez de Rodondo EMPLACEMENT 7 R8 1 376.380 Mbre Débourgement Mbre Ferti-Floraison Véraison ouche Maturité debut mi/f | début mi/déb début mi/v fin yeux grap lité fin 1.6 3.6 6.6 24.7 1,8 7,8 1 0 2 3 Crappe : G - (M - (P) Dim : 13 Compacité: L - (M - C Mill: Baie: TG - G - M- P Dim: 13×13 3 2 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus 8 2

Juntumhunda

Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré

Saveur: s - m - ar - fox - herb

Pépins: avec - apyrène

Port: Vigueur: 2

daataabadaa liintaskimtaa (

ANUEE: 1996 MOM Tamorez de Redondo MAZLACIMIENT 7 R8 1 376.380 Pgal . 2.84 nche Nbre Débourrement Ubre yeux début mi/déb grap début mi/v fin Maturité Ferti-Floraison lité debut mi/f | fin 1/ 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacitó: L - 14 -C d Pour : Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pópins : avec - apyrène Fort : Vigueur :

daataalaasiaalaasiaal

Juntum/metraliment

tuutuulanta<mark>utuutuutuussii setiiden j</mark>illä kaska kaska kaska kakka jillintaihintinilinutuuluntuul

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Famarez de Redondo 7 R8 s. 376-380 s. 2

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 160 et sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 1912 fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entrèrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face in Terrieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 200 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - auveteux 124 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Pace supérieure

blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 263.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 89

Famorez de Redondo N° d'ordre : 7R8A-376-3800.2 Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

duaten kertan hurtuakan taul

A contour uni - anguleux - côtela. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue. : coloré 264 vert 265.

Bourgeon

Inntminute

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

- Calvo go

Tamarez de Redondo

duutanimimilmilmilmilmilmil

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

* 1 Juutuuluutu

7 R80-376-380 A12

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 2/12 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiel fement - totalement.

Calvo-90

N° d'ordre: Famorez de Redondo
Désignation: 7 R8 4.376.380 A.2
Emplacement:

Juutuuluuti

GRAPPE

dantaskastarilantudadud

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 42 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 87.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 15 x 14). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 90 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - per apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(1) A saveur neutre 1/2 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation façile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 1212 A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131)- long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134 A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pepins - apyrène.

Tamarez de Redondo 7 R8 s-376-380 42

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Juntum Innin

rhaataarkaa mahaataa l

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (21).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - sotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).-: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effecé (2).

: sinuoux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 91

isignation: Tamarez de Redondo mplacement: 7 R8 1 376.380 : 1 -2 - 3
: 4 - 5 - 6 igle des nervures exe : 7 - (8) - (9) 1/1. : (10) - 11 2/1 : 12 - 13 - 14 - (15) - (16) ombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 rof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 rof. sinus latéral Inf. : (25) - (26) - (27) - 28 - 29 orme sinus pétiolaire ond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) inus pétiolaire ouvert ent au fond du sinus pétiolaire : (30) : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 orme sinus latéral Sup. 'ond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : (271) inus latéral Supérieur ouvert : (40) - (41) ents : forme : 42 - 43 - (44) Dents (angle) : (45) - (46) - 47 Ingle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Thre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 :(60) - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - (65) - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

daatadaataalaataal

42 Juntonlunti

d'ordre :